

# 営農経済部 稲作 特別情報

管内 18 地区の定点圃場にて、分けつ、草丈などの生育状況、病害虫の発生状況などを重点に調査を行った“**水稻生育状況調査**”結果を提供しますので、ご活用ください。

気象庁は14日、「**中国地方が梅雨入りしたとみられる**」と発表しました！

広島県の向こう1週間の天気は、前線や湿った空気の影響で**曇りや雨の降る日が多い**でしょう。最高気温、最低気温はともに平年並か平年より高い見込みです。**いもち病の発生に注意！！**

## ◆ トビイロウンカ（令和4年6月13日現在）

JA 広島市管内では、

### トビイロウンカの飛来は未確認。


※梅雨前線の影響により、大陸からの飛来が予想されます。

引き続き、今後の動向に注意してください。  
また、株元を中心に観察を行ってください。



ウンカ類飛来予測図

2022年06月15日 07時予測



## ◆ いもち病について

～今後1カ月の“いもち病”発生予測について(6月8日に農水省より発表)～

- **いもち病**の発生については、四国地方で多く、**中国地方でやや多い**と予想
- **断続的な降雨がある場合**には、**いもち病**が急激に発生する恐れがあり、**警戒が必要**

## ◆ 発生条件

- ✓ 気温：繁殖適温 25～28℃の温度が連続する時
- ✓ 湿度が90%以上の日が続き、日照不足の時
- ✓ 稲の葉色が濃い場合（窒素過多）

## ◆ 防除対策・薬剤

稲の生育や収量に大きな影響を与えますので、**防除**を徹底しましょう！



▲葉いもちの病斑

品名		使用時期	回数	10aあたりの 使用量	規格	当用価格 (税込)
予防剤	オリゼメート粒剤	初発の10日前 から初発時	2回 以内	4kg	3kg	2,639円
予防剤	コラトップジャンボ	出穂5日前まで	2回 以内	10～13P	50g×10P	3,523円
治療剤	ブラシン粉剤DL	収穫7日前まで	2回 以内	3～4kg	3kg	1,215円