

稲作 特別情報

営農経済部

管内 18 地区の定点圃場にて、分けつ、草丈などの生育状況、病害虫の発生状況などを重点に調査を行った“**水稻生育状況調査**”結果を提供しますので、ご活用ください。

向こう 1 週間の天気は、高気圧に覆われて**晴れる日**もある見込みですが、気圧の谷や湿った空気の影響で**曇る日**が多く、期間の前半に**雨の降る日**があるでしょう。

最高気温は、平年並か平年より低い日が多く、最低気温は、平年並の所が多いでしょう。



◆ トビイロウンカ（令和4年7月22日現在）

JA 広島市管内では、**トビイロウンカの飛来は未確認**。

※引き続き、今後の動向に注意し、株元を中心に観察を行ってください。



◆ いもち病について

管内 18 地区の定点調査によると、管内北部地域を中心に**葉いもちの病斑**が見られ、また、南部地域でも山際、冷や水のあたり口などに発生していると報告があります。

早生品種の出穂前・穂ばらみ期の防除を徹底してください！

◆ 発生条件

- ✓ 気温：繁殖適温 25～28℃の温度が連続する時
- ✓ 湿度が90%以上の日が続く、日照不足の時
- ✓ 稲の葉色が濃い場合（窒素過多）

◆ 防除

今後の気象条件により「**穂いもち**」「**枝梗いもち**」になってしまうと、籾の収量や品質に大きな影響を与えますので「**令和4年 JA広島市稲作ごよみ**」を参考にし、「**基本防除**」「**随時防除**」を徹底しましょう！



▲葉いもちの病斑

	品 名	使用時期	回数	10a あたりの 使用量	当用価格 (税込)
基本防除	ビームバシボン粉剤 DL	収穫 14 日前まで	3回 以内	4kg	2,295 円
	トレバリダビーム粉剤 DL	収穫 14 日前まで	3回 以内	3～4kg	2,806 円
	コラトップトレボン粒剤	出穂 5 日前まで	2回 以内		4,897 円
随時防除	ゴウケツモンスター粒剤	出穂5日前まで 但し、 収穫45日前まで	1回	3kg	6,179 円
	ブラシン粉剤DL	収穫 7 日前まで	2回 以内	3～4 kg	1,215 円
	ブラシンフロアブル			60～150L (1000 倍)	2,387 円