

営農経済部

稲作

特別情報

管内 18 地区の定点圃場にて、分けつ、草丈などの生育状況、病害虫の発生状況などを重点に調査を行った“**水稻生育状況調査**”結果を提供しますので、ご活用ください。

今週は、**真夏日**が続き**猛暑**が予想されます！**熱中症**には注意してこまめな水分補給し、作業を行ってください



◆ トビイロウンカ（令和4年8月2日現在）

JA 広島市管内では、**トビイロウンカの飛来は未確認。**

※引き続き、今後の動向に注意し、株元を中心に観察を行ってください。

◆ カメムシ類について

今年は、空梅雨、高温などの影響により、**カメムシ**の発生が**多くなると**予想され、8月2日現在、岡山県、島根県、山口県と広島県を囲むように**注意報**を出しています。

カメムシが籾を吸汁することで、**斑点米**になり、米の品質低下に繋がります。

◆ 対策のポイント

➤ 2回の「**基本防除**」を行う

≪1回目≫ 穂ぞろい期（7～8割の出穂） ≪2回目≫ 穂ぞろい期 防除後7～10日頃

➤ 畦畔の除草は、出穂の7日前までに行う

➤ 出穂後の除草は、殺虫剤散布後に行う

◆ 今後、多発生が予想されるカメムシ類



▲アカスジカスミカメムシ



▲クモヘリカメムシ



▲ホソハリカメムシ

「令和4年 JA広島市稲作ごよみ」を参考にし、「**基本防除**」、「**随時防除**」を徹底しましょう！

品 名	使用時期	回数	10aあたりの 使用量	規格
スタークル粒剤	収穫 7日前 まで	3回 以内	3 kg	3kg
トレボン粉剤DL			3～4 kg	3kg
ラブサイドスタークル粉剤 DL				3kg