

営農経済部

稲作

特別情報

管内 18 地区の定点圃場にて、病害虫、分けつ、草丈などの水稻生育状況調査を行い、毎週、病害虫の発生状況などの情報提供を行いますので、ご活用ください。

広島県（三入・広島地点）では、5月末に**いもち病の発生好適条件**になりました。

好適条件から **7 日後が発生する時期**と推測されます。

広島地方気象台は、向こう 1 週間の天気は、前線や湿った空気の影響で

曇りや雨の降る日が多いと予想されています。**いもち病の発生に注意しましょう！！**



◆いもち病について

糸状菌が引き起こす病気で、**稲の全生育ステージ**で発生。

【発生条件】

- ✓ 気温：繁殖適温 25～28℃の温度が連続する時
- ✓ 湿度が90%以上の日が続く、日照不足の時
- ✓ 稲の葉色が濃い場合（窒素過多）




▲葉いもちの病斑

【防除対策・薬剤】

稲の生育や収量に大きな影響を与えますので、**防除**を徹底しましょう！

品 名			使用時期	回数	10a あたりの 使用量	規格
常 発 地 帯	予防剤	オリゼメート粒剤	初発の10日前 から初発時	2回 以内	4kg	3kg
	予防剤	コラトップジャンボ	出穂5日前まで		10～13P	50g×10P
多 発 生 時	治療剤	ブラシン粉剤DL	収穫7日前まで		3～4kg	3kg



補植用の取り置き苗も“伝染源”となるため、早目に処分しましょう！！

～有害鳥獣(シカ)対策について～

水稻の茎葉が**柔らかい時期**である**田植え直後～分けつ期(3週間頃)**を特に好み、被害が集中します！！

➤ 深水管理による被害軽減

ニホンジカは、水中に口を入れて採食しないことから、**田植え後～中干しまで水深を7cm程度の深水に保つこと。**

➤ 2m程度の高さの柵を設置

シカの運動能力は **1.5mの高さを飛び越えるジャンプ力**があり、耐久性の高いワイヤーメッシュなどの防止柵を設置しましょう。



▲シカによる食害