

# 営農経済部 お役立ち情報

## 水稲（トビイロウンカ注意報）について

令和2年7月30日付で広島県より病害虫発生予察情報注意報第2号が発表されています。

1. 作物名 : 水稲
2. 病害虫名 : トビイロウンカ
3. 適用地域 : 県内全域
4. 発生量 : 多
5. 防除適期 : 1回目 7月下旬から8月上旬、2回目 8月中旬から9月上旬
6. 防除対策 :

田んぼに入り、株元をたたいて確認して下さい！



- ① ほ場全体の状況を確認し薬剤による防除を行う。
- ② 要防除水準は飛来後第2世代幼虫が株あたり5頭以上。
- ③ 穂ばらみ期、穂そろい期の防除を行う場合は、トビイロウンカに登録のある薬剤を使用する。
- ④ トビイロウンカは株元付近に生息しているため、粉剤や液剤は株元に十分届くよう散布する。

### ● 穂ばらみ期

| 薬型 | 品名                           | 使用時期・回数          | 10aあたりの使用量               |
|----|------------------------------|------------------|--------------------------|
| 粉剤 | パダントレバリダビーム<br>粉剤DL (3 kg)   | 収穫21日前まで<br>3回以内 | 3~4 kg                   |
| 粉剤 | ビームバシボン粉剤 DL<br>(3kg)        | 収穫14日前まで<br>3回以内 | 3~4 kg                   |
| 粒剤 | パダンバッサオリゼメート<br>粒剤 (3 kg)【劇】 | 収穫30日前まで<br>2回以内 | 3~4 kg                   |
| 液剤 | アミスター<br>トレボンSE (500ml)      | 収穫14日前まで<br>3回以内 | 1000倍<br>(散布水量: 60~150L) |

### ● 穂そろい期

| 薬型 | 品名                          | 使用時期・回数         | 10aあたりの使用量               |
|----|-----------------------------|-----------------|--------------------------|
| 粉剤 | ラブサイドスタークル<br>粉剤DL (3 kg)   | 収穫7日前まで<br>3回以内 | 3~4 kg                   |
| 粒剤 | スタークル粒剤<br>(3 kg)           | 収穫7日前まで<br>3回以内 | 3 kg                     |
| 液剤 | ビームエイトスタークルゾル<br>(500ml)【劇】 | 収穫7日前まで<br>3回以内 | 1000倍<br>(散布水量: 60~150L) |

※ 農薬のご使用については、登録内容をよくご確認の上、適正に使用してください。

※ ビームエイトスタークルゾルは、令和2年7月1日より医薬用外劇物に指定されました。



長翅型成虫



短翅型雌成虫



株元で吸汁加害



坪枯れ被害