

営農経済部 お役立ち情報

水稻（トビイロウンカ警報）について

令和2年8月13日付で広島県より病害虫発生予察情報警報第1号が発表されました。

1. 作物名 : 水稻
2. 病害虫名 : トビイロウンカ
3. 適用地域 : 県内全域
4. 発生量 : 多 8月6日発表の1ヶ月予報（広島地方気象台）によると、今後の気温は高いと予想され、トビイロウンカがさらに増加することが懸念されます。
5. 防除適期 : 8月中旬から9月上旬
6. 防除対策

田んぼに入り、株元をたたくて確認して下さい！



- ① ほ場全体の状況を確認し、薬剤による防除を行きましょう。
- ② 穂ばらみ期、穂ぞろい期の基本防除を必ず行いましょう。
- ③ 8月下旬頃、発生状況を確認し、株あたり5頭以上発生していたら、随時防除をしましょう。
- ④ トビイロウンカは株元付近に生息しているので、粉剤や液剤は株元に十分届くよう散布しましょう。

● 穂ぞろい期

薬型	農薬名	使用時期・回数	10aあたりの使用量
粉剤	ラブサイドスタークル 粉剤DL (3 kg)	収穫7日前まで 3回以内	3~4 kg
粒剤	スタークル粒剤 (3 kg)	収穫7日前まで 3回以内	3~4 kg
液剤	ビームエイトスタークルゾル (500ml)【劇】	収穫7日前まで 3回以内	1000倍 (散布水量：60~150L)

● 随時防除

薬型	農薬名	使用時期・回数	10aあたりの使用量
粉剤	トレボン粉剤DL (3 kg)	収穫7日前まで 3回以内	3~4 kg
粉剤	MR.ジョーカー粉剤DL (3 kg)	収穫7日前まで 2回以内	4 kg
液剤	トレボン乳剤 (500ml)	収穫14日前まで 3回以内	散布水量：60~150L (ウンカ類1000~2000倍) (カメムシ類2000倍)
液剤	MR.ジョーカーEW (500ml)	収穫14日前まで 2回以内	散布水量：60~150L (2000倍)
液剤	エクシードフロアブル (500ml)	収穫7日前まで 3回以内	散布水量：60~150L (2000倍)

※ 農薬のご使用については、登録内容をよくご確認の上、適正に使用してください。

※ ビームエイトスタークルゾルは、令和2年7月1日より医薬用外劇物に指定されました。

※ ビームエイトスタークルゾル、MR.ジョーカーEW、エクシードフロアブルについては、無人航空機による散布が可能です。



長翅型成虫



短翅型雌成虫



株元で吸汁加害



坪枯れ被害