

営農経済部 稲作 特別情報

管内 18 地区の定点圃場にて、分けつ、草丈などの生育状況、病虫害の発生状況などを重点に調査を行った“**水稻生育状況調査**”結果を提供しますので、ご活用ください。

先週は、平年より 6 日早い 7 月 13 日に梅雨明けが発表されましたが、湿った空気の影響で突然の激しい降雨がありました。今週は、回復に向かい暑い日が予想されますが、突然の降雨には注意してください。



◆ トビロウンカ について(令和3年7月16日現在)

JA 広島市管内では、

トビロウンカの飛来は未確認。

※長崎県に続き、**三重県**、**岐阜県**でも注意報が出ましたので、引き続き、今後の動向に注意し、株元を中心に観察を行ってください。



◆ セジロウンカについて

広島県病虫害発生予察情報予報第3号(水稻)に

よると**セジロウンカ**の発生が確認されました。

JA 広島市管内の調査でも確認されましたが、

要防除水準には達していません。

引き続き、株元に注意して観察を行ってください。

要防除水準；幼穂形成期から穂ばらみ期に10頭/株以上



▲セジロウンカ 約 4.0 mm (背面が白い)

◆ いもち病について

先週の調査では、**葉いもち発生がやや多く**確認されました。

いもち病に弱い品種 (コシヒカリ・ひとめぼれ・あきさかり等)

では特に注意してください。

発生が見られた圃場では防除を行ってください！

◆ いもち病治療剤

稲の生育や収量に大きな影響を与えますので、

「基本防除」、「随時防除」を徹底しましょう！

ブラシンは、治療効果にすぐれるフェリムソンと、

予防効果に定評のあるフサライドの混合剤で、散布速期幅が広い点が特徴！



品名	使用時期	回数	10aあたりの 使用量	規格	当用価格 (税込)
ブラシン粉剤DL	収穫7日前まで	2回 以内	3~4 kg	3kg	1,215円
ブラシンフロアブル	収穫7日前まで		60~150L (1000倍)	500ml	2,387円