

営農経済部 稲作 特別情報


管内 18 地区の定点圃場にて、分けつ、草丈などの生育状況、病害虫の発生状況などを重点に調査を行った“**水稲生育状況調査**”結果を提供しますので、ご活用ください。

今年は、天候不順の中、心配していた**トビイロウンカ**の被害もなく推移してきました。刈り取りまで気を抜かず、**最後の仕上げ**を行いましょう！！

◆ トビイロウンカ について(令和3年9月3日現在)

JA 広島市管内では、**トビイロウンカの飛来は未確認。**

※中生品種は、引き続き、株元を中心に観察を行ってください。



<農林水産省 中国四国農政局より>

図 水稲の県別作柄概況 (8月15日現在)

令和3年産水稲の8月15日現在における“**作柄概況**”が発表されました。

広島県の作柄はやや不良の見込みとなっております。

※作柄は、その後の気象が平年並みに推移するものとして予測を行っているため、今後の気象条件等により変動することがあります。



◆いもち病・紋枯病について

JA広島市管内定点調査の報告によりますと、南部地域を中心に8月中旬頃からの**長雨**による「**いもち病**」8月下旬頃からの**高温**による「**紋枯病**」が局所的に発生しています！

圃場を確認の上、**防除**を行ってください。

特に、刈り取りまで約**1か月**ある

中生品種は、注意をしてください！

<防除剤>

稲の生育や収量に大きな影響を与えますので、「**基本防除**」、「**随時防除**」を徹底しましょう！



▲いもち病

病害	品名	使用時期	回数	10aあたりの使用量	規格	当用価格(税込)
稲こうじ病 いもち病	ブラシン粉剤DL	収穫7日前まで	2回以内	3~4 kg	3kg	1,215円
	ブラシンフロアブル			60~150L (1000倍)	500ml	2,387円
稲こうじ病 いもち病 ウンカ類 カメムシ類	ブラシンジョーカー粉剤DL			3~4 kg	3kg	2,283円
紋枯病	バリダシン液剤5	収穫14日前まで	5回以内	60~150L (1000倍)	500ml	1,863円